

simple ou peu rameuse, à rameaux dressés, à longs internodes, et par ses feuilles larges, à dents arrondies. La plante est d'ailleurs très-peu glanduleuse et fleurit un mois au moins avant l'*E. officinalis*. Selon Gremli, c'est l'*E. picta* de Wimmer.

Je saisis l'occasion de redresser un lapsus qui s'est glissé dans le Bulletin de l'année dernière. A la troisième ligne de la note sur le *Senecio uniflorus incanus*, au lieu de *surtout l'uniflorus* et le *carniolicus*, lisez : *surtout l'incanus*, etc.

En outre, le *Rosa Semproniana* du Simplon n'est pas l'*anoplantha* de Christ, c'est un *pomifera coriifolia*, de l'avis de M. le docteur Christ lui-même. L'*anoplantha* est un *pomifera rubrifolia*. Ce dernier se trouve en-dessus de Vissoie, val d'Anniviers.

L. FAVRAT.

SUPPLÉMENT.

au Guide du Botaniste sur le Grand Saint-Bernard,
de M. le Chanoine Tissières.

Par M. E. Favre, de Sembrancher, Chanoine du Grand Saint-Bernard.

I. RENONCULACÉES.

THALICTRUM.

1. *Th. minus*, L. *Th. montanum*, Wallr. Eboulis rocheux des montagnes et bien exposés au soleil. Au fond des Combes, près de Pradaz. Altitude : 1,950 mètres environ. Fleur vert-jaunâtre ou vert-rougeâtre. Juin-Août. Rare.
2. *Th. minus saxatile*, Gaud. *Th. saxatile*, DC. *Th. collinum*, Wallr. Endroits très-secs, sur les rochers. Aux Combes, non loin du précédent. Altitude : 1950 mètres. Fleurs jaunâtres. Juin-Août. Rare.

RANUNCULUS.

1. *R. glacialis et holosericeus*. Gaud. Lieux humides et graveleux. Au Col Fenêtre ; sous le Col de Menouve ; au Mont-Mort. Altitude supérieure : 2,800 mètres. Fleurs blanches et purpurines. Juin-Septembre.

DELPHINIUM.

1. *D. Consolida*. L. Cultures et moissons. Champs sous St-Rémi. Altitude : 1,630 mètres. Fleurs bleues. Juin-Août.
2. *D. Ajacis*. L. Jardins de Saint-Rémi, d'où il s'échappe quelquefois. Altitude : 1,650 mètres. Fleurs bleues. Juin-Août.

ACONITUM.

1. *A. hebegynum*. DC. Lieux ombragés et humides. A Marengo, près de la route. Altitude : 1,950 mètres. Fleurs bleues. Juillet-Septembre. Rare.

NB. Cette espèce ne doit pas être confondue avec l'*A. penninum*, Seringe.

ACTÆA.

1. *A. spicata*. L. (Vulg. Herbe de St-Christophe). Dans les bois montagneux. Sur la route, entre Fourtz et le bourg de St-Pierre, près de l'endroit où Napoléon I^{er} faillit se précipiter, lors de son passage du St-Bernard. Altitude : 1,700 mètres. Fleurs blanches. Mai-Juin.

2. BERBÉRIDÉES.

BERBERIS.

1. *B. vulgaris* L. (Vulg. Epine-Vinette). Rochers et pâturages secs. Vers la cascade de Pradaz, à Plantaluc ; entre Proz et le bourg de St-Pierre. Altitude supérieure ; 2,020 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août.

3. PAPAVERACÉES.

PAPAYER.

1. *P. Rhæas*. L. (Vulg. Coquelicot) Champs des deux côtés de la montagne. Près de St-Rémi, vers le château du bourg de St-Pierre. Altitude : 1650 mètres. Fleurs de couleur écarlate. Juin-Août.

CHELIDONIUM.

1. *Ch. majus*. L. (Vulg. Grande Eclaire). Bords des chemins et haies. Près de St-Rémi et du bourg de St-Pierre. Altitude : 1,640 mètres. Fleurs jaunes. Mai-Août.

4. FUMARIACÉES.

FUMARIA.

1. *F. officinalis*. L. Cultures et moissons. Jardin du Prieur du bourg de St-Pierre, sous St-Rémi. Altitude : 1,640 mètres. Fleurs purpurines striées de blanc, de rose et de violet. Juin-Septembre.

5. CRUCIFÈRES.

RAPHANUS.

1. *R. Raphanistrum*. L. (Vulg. Ravenelle). Prairies et cultures. A Ravaire, près du bourg de St-Pierre. Altitude 1,640 mètres. Fleurs blanches striées de violet. Juin-Août.

BRASSICA.

1. *B. campestris*. L. Prairies et cultures. Près de Fourtz, sous la route. Altitude : 1,700 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août.

SINAPIS.

1. *S. arvensis*. L. (Vulg. Senevé). Bords des chemins et cultures. Entre Fourz et la cantine de Proz. Altitude : 1,750 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août.

LEPIDIUM.

1. *L. sativum*. L. (Vulg. Cresson alénois). Cultures et jardins. Au bourg de St-Pierre. Altitude : 1,645 mètres. Fleurs blanches. Juin-Août.

DIPLTAXIS.

1. *D. Erucastrum*. Godr. et Gren. *Erucastrum obtusangulum*, Rchb. Lieux secs et graveleux, aux bords des chemins. Près de Fourtz; près de St-Rémi. Altitude : 1,780 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août.

ERYSIMUM.

1. *E. helveticum*. DC. Terrains secs et graveleux. Aux bords du ruisseau, sous la cabane du Pointiers. Altitude : 1,700 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août. Rare.
2. *E. strictum*. Wetterau. *E. hieracifolium*, L. *E. virgatum*, DC., non Roth. Rochers. Près du pont d'Allèves, entre Liddes et le bourg de St-Pierre. Altitude : 1,580 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août.

SYSYMBRIUM.

1. *S. Alliaria*. Scop. *Alliaria officinalis*. Andrz. Bords des chemins et vieux murs. Sous St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs blanches. Juin-Août.
2. *S. Sophia*. L. Endroits incultes et bords des chemins. Près de St-Rémi. Altitude : 1,620 mètres. Fleurs petites, jaunâtres. Juin-Août.
3. *S. Thalianum*. Gay. *Arabis Thaliana*. L. Cultures et endroits secs. Près de St-Rémi et du bourg de St-Pierre. Altitude : 1,640 mètres. Fleurs blanches. Juin-Juillet.

ARABIS.

1. *A. serpyllifolia*. Vill. Rochers et éboulis rocailleux. Entre l'Ardifagoz et le Pain de Sucre, sur la pointe de Drônaz. Altitude : 2,900 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août. Extrêmement rare.
2. *A. arcuata*. Schuttleworth. Dans un endroit très sec, sur un petit monticule dominant une petite source, avant d'arriver à la cabane de l'Ardifagoz. Altitude : 2,230 mètres. Fleurs blanches. Juin-Août. Rare.
3. *A. perennis*. L. Lieux incultes et ombragés. Dans la forêt, sur le village de St-Rémi. Altitude : 1,700 mètres. Fleurs blanches. Juin-Août. Rare.
4. *A. perfoliata*. Lam. *Turritis glabra*. L. lieux cultivés et sous les vieux murs. Près de St-Rémi. Altitude : 1,600 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août.

ALYSSUM.

1. *A. calycinum*. L. *A. campestre*. M. B. (Vulg. Passerage). Lieux incultes et graveleux. Au-dessus de St-Rémi. Altitude : 1,650 mètres. Fleurs jaunâtres. Juin-Août.

DRABA.

1. *D. Fladnizensis*. Wulf. Je la rappelle comme localité. Outre les Roches-Polies, indiquées par M. Tissières, je l'ai récoltée au Col Fenêtre, à la Pointe de Drônaz et en grande quantité sur l'arête entre le Mont-Mort et la Pointe de Barasson. Altitude supérieure 2,900 mètres. Fleurs blanches. Juin-Août.

EROPHILA.

1. *E. majuscula*. Jord. Cultures maigres et bords des chemins. Mont-Cubit; sur Saint-Rémi. Altitude supérieure : 2,400 mètres. Fleurs blanches. Avril-Juillet. C'est une forme de la *Drave du printemps*, elle a les sépales ovales, arrondis, légèrement hispides au sommet : les pétales obovés, trois fois plus longs que le calice, à lobes un peu élargis, obtus, visiblement veinés; siliques assez grandes, oblongues ou elliptiques, rétrécies à la partie inférieure; graines ovales, d'un brun pâle, environ 40 dans chaque loge; feuilles larges, oblongues-obovées, aiguës, dentées sur les bords, rétrécies en un large pétiole et couvertes de poils courts bi- ou trifurqués, scapes élevés, plus ou moins hispides. Cette espèce se reconnaît facilement à la grandeur de ses fleurs et à ses feuilles larges, dentées et hispides.

THLASPI.

1. *Th. arvense*. L. Dans les cultures. Près de St-Rémi; au château du bourg de St-Pierre. Altitude; 1650 mètres. Fleurs blanches. Mai-Juillet.
2. *Th. Gaudinianum* Jord. Pâturages et prairies sèches. Entre Proz et Fourtz; au fond du pré de la Pierraz. Altitude supérieure : 2,060 mètres. Fleurs blanches.

Juin-Août. Cette plante est bisannuelle ou subvivace; tiges simples, vertes, ainsi que les feuilles, et non glauques; les radicales spatulées entières, les caulinaires ovales-oblongues, brièvement articulées à la base; fleurs petites en grappe courte, souvent penchée, s'allongeant ensuite, sépales oblongs, pétales cuneiformes, une fois plus longs que le calice, blancs ou légèrement rosés à l'extérieur; étamines dépassant la corolle, anthères d'abord rosées, ensuite violettes; silicules un peu ascendantes sur un pédicelle étalé, oblongues-obcordées, rétrécies inférieurement, échancrées au sommet, qui est brièvement dépassé par le style, graines brunes, 5 à 6 dans chaque loge.

6. VIOLARIÉES.

VIOLA.

1. *V. sciaphila*, Koch. *V. umbrosa*, Saut., non Fries. Prairies et pâturages, souvent sous les arbrisseaux. Près de St-Rémi. Altitude: 1630 mètres. Fleurs d'un violet pâle. Mai-Juin. Rare.
2. *V. Ruppilii*. All. *V. pumila* a) *cordifolia*. Gaud. *V. canina* v. *lucorum* Rchb. Pâturages buissonneux. Près de St-Rémi. Altitude: 1700 mètres. Fleurs d'un bleu vif. Juin-Août. Cette espèce ou variété diffère du type par ses tiges plus élevées, ses feuilles en cœur oblongues, les stipules des feuilles supérieures égalant ou dépassant la moitié de la longueur du pétiole.
3. *V. tricolor* v. *bella*. Godr. et Gren. *V. bella* et *virgata*. Gren. Aux bords des chemins. Vers la croix, sous le village de St-Rémi. Au château du bourg de St-Pierre. Altitude: 1650 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Juillet.
4. *V. tricolor arvensis*. Gaud. Champs et cultures. Près de St-Rémi; au château du bourg de St-Pierre. Altitude: 1650 mètres. Fleurs d'un jaune pâle allant légèrement au bleu. Juin-Août.

7. RÉSÉDACÉES.

RÉSÉDA.

1. *R. lutea*. L. Dans les lieux pierreux et aux bords des chemins. Près de St-Rémi. Altitude: 1650 mètres. Fleurs d'un jaune verdâtre. Juin-Août.

8. POLYGALÉES.

POLYGALA.

1. *P. comosa*. Schk. Dans les pâturages secs. A l'Ardifagoz; aux Combes; aux Contours; aux Plançadès. Altitude supérieure: 2000 mètres. Cette plante se distingue du *P. vulgaris*, L., par ses tiges plus droites et moins rameuses, ses fleurs en épis plus serrés, couronnées par une houppe formée par les bractées plus longues que les pédicelles. Les fleurs varient du bleu au rouge et plus rarement au blanc. Juin-Août.
2. *P. alpestris*. Rchb. Pâturages secs et taillis. Dans la forêt de Plantaluc, près de St-Rémi. Altitude supérieure: 2000 mètres. Fleurs bleues. Juillet-Août.
3. *P. amara* b) *alpina*. Gaud. Pâturages secs et pelouses sur les rochers. A Mont-Cubit; au fond des Combes; aux Contours. Altitude supérieure: 2400 mètres. Fleurs d'un bleu verdâtre. Juin-Août. Quelques auteurs confondent cette espèce avec la précédente et n'en font qu'une. Gaudin les sépare et avec des caractères très distincts, à mon avis; je suis donc cet auteur.
4. *P. anstriaca* Crantz. *P. uliginosa*. Rchb. *P. myrtifolia*. Fries. Pâturages humides et parfois graveleux. Altitude supérieure: 1900 à 2000 mètres. Le long de la plaine de Proz, çà et là. Au-dessus du chalet de Barasson, dans la forêt de Plantaluc. Fleurs blanches, quelquefois légèrement rosées. Juin-Août.

9. SILÉNÉES.

SILENE.

1. *S. inflata* v. *alpina*. Koch. *S. alpina*. Thom. *S. glareosa*, Jord. *Lychnis inflata*. Mihi. Pâturages secs et graveleux.

A l'Ardifagoz; au col Fenêtre; sous le glacier du Velan. Altitude supérieure: 2600 mètres. Fleurs blanchâtres. Juillet-Août.

2. *S. Vallesia*. L. Pâturages secs et graveleux. Entre l'Ardifagoz et le Col Serénaz; abondant à St-Rémi. Altitude: 2300 à 2400 mètres. Fleurs blanchâtres légèrement striées de pourpre. Juillet-Août. Camille Carron.

LYCHNIS.

1. *L. Flos Cuculli* L. (Vulg. Fleurs de coucou.) Prairies humides. A Ravaire, près du bourg de St-Pierre. Altitude: 1640 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août. Assez rare.
2. *L. dioica*. DC. Prairies humides. Sous le village de St-Rémi. Altitude: 1600 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août.
3. *L. Githago*. Lam. *Agrostemma Githago*. L. (Vulg. Nielle). Dans les cultures. Près de St-Rémi. Altitude: 1630 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août.

10. ALSINÉES.

SAGINA.

1. *S. procumbens*. L. Lieux humides et sablonneux. Près de St-Rémi. Près de Fourtz. Altitude: 1750 mètres. Fleurs blanchâtres, très petites. Juin-Août.

ARENARIA.

1. *A. sphærocarpa*. Ten., Jord. Cultures sèches et sablonneuses; aux bords des chemins. Près de St-Rémi. Altitude: 1630 mètres. Fleurs blanc-verdâtres. Juin-Juillet.
2. *A. multicaulis* L. *A. ciliata* v. *frigida*. Koch. Endroits graveleux. Au torrent, sous le glacier du Velan; au coin du lac. Altitude supérieure: 2480 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août.

HOLOSTEUM.

1. *H. umbellatum*. L. *Alsine umbellata*. DC. (Vulg. Tout os.) Cultures et bords des chemins. Près de St Rémi et du bourg de St-Pierre. Altitude: 1630 mètres. Fleurs blanchâtres. Juin-Août.

CERASTIUM.

1. *C. vulgatum*. DC. *C. viscosum*. Fries. *C. glomeratum*. Thuil. Lieux secs et sablonneux. Sur les chalets du sommet de Proz. Altitude : 1940 mètres. Fleurs blanchâtres. Juillet-Août.
2. *C. triviale*. Link. Lieux secs et incultes et parfois dans les pâturages. A Ferret. Altitude : 1800 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août.
3. *C. pedunculatum*. Gaud. *C. filiforme*. Schl. Lieux humides et graveleux. A la Combaz ; au Col-Fenêtre ; au torrent du Velan ; au Mont-Mort. Altitude supérieure : 2900 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août.

11. MALVACÉES.

MALVA.

1. *M. moschata*. L. Prairies sèches et aux bords des chemins. Vers le premier chalet au-delà du Buttier, en haut de St-Rémi. Altitude : 1700 mètres. Fleurs d'un rose-violet. Juin-Août.
2. *M. rotundifolia*. L. Aux bords des chemins et près des habitations. A St-Rémi ; au bourg-de-St-Pierre. Altitude : 1650 mètres. Fleurs roses striées de violet. Juin-Août.

12. HYPÉRICINÉES.

HYPERICUM.

1. *H. perforatum*. L. Aux bord des champs et lieux graveleux. Sous St-Rémi. Altitude : 1620 mètres. Fleurs jaune-orangé. Juin-Août.

13. GÉRANIÉES.

GÉRANIUM.

1. *G. pratense*. L. Pâturages et prairies. Vers la cascade de Pradaz. Altitude : 2000 mètres. Fleurs violettes. Juillet-Août.
2. *G. aconitifolium*. L'Hérit. Lieux secs et arides. A la montée de Plantaluc, contre les rochers. Altitude : 2100 mètres. Fleurs blanches, légèrement striées de violet. Juin-Août. Rare. Dans ces mêmes rochers on récolte la *Draba frigida*. Saut., et l'*Artemisia glacialis*. L.

3. *G. pyrenaicum*. L. Lieux incultes. Sous St-Rémi ; aux Contours ; à Fourtz. Altitude supérieure : 1900 mètres. Fleurs petites, violettes. Juin-Août.
4. *G. pusillum*. L. *G. rotundifolium*. Fries. Lieux incultes. Sous St-Remi. Au chalet de Barasson. Altitude supérieure : 2000 mètres. Fleurs petites, violettes. Carpelles pubescents, non ridés. Juin-Août.
5. *G. molle*. L. Endroits secs et incultes : aux bords des chemins. Près du chalet de Pointier ; vers la montagne de Sur-le-Four. Altitude : 2000 mètres. Fleurs petites, purpurines. Carpelles glabres et ridés en travers. Juin-Août.
6. *G. Robertianum*. L. (Vulg. Herbe à Robert.) Bords des chemins. Sous St-Rémi, près de Ceresay. Altitude ; 1500 mètres. Fleurs petites, purpurines. Juin-Juillet.
7. *G. cicutarium*. L. Gaud. *Erodium tri iale*. Jord. Bords des chemins. Sous St-Rémi. Altitude : 1620 mètres. Fleurs petites, purpurines. Mai-Septembre.

14. ACÉRINÉES.

ACER.

1. *A. Pseudo-platanus*. L. Prairies, sous St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs vert-jaunâtre. Juin-Juillet.

15. PAPILIONACÉES.

ONONIS.

1. *O. Columnæ*. All. *O. parviflora*. Lam. Lieux arides. Aux Contours, sous St-Rémi. Altitude : 1500 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août.

MEDICAGO.

1. *M. lupulina*. L. Prairies et bords des chemins. A St-Rémi ; au chalet de la Pierraz. Altitude supérieure : 2100 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août.
2. *M. falcata*. L. Dans les endroits secs. Au-dessous de St-Rémi. Altitude : 1600 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août.

MELILOTUS.

1. *M. officinalis*. Lam. Dans les champs et les prairies, sous St-Rémi. Altitude : 1600 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août.

TRIFOLIUM.

1. *T. alpinum*, variété *albiflorum*. Gaud. (Vulgairement Réglisse des montagnes). Pâturages. A la Baux ; au fond du pré de la Pierraz. Altitude : 2300 mètres. Cette forme se distingue du type par ses fleurs blanches, quelquefois jaunâtres ; ses feuilles d'un vert moins foncé et par sa stature généralement plus petite. Juin-Août.
2. *T. minus*. Smith. *T. filiforme*. Koch. *T. procumbens* Godr. et Gren. Cultures et sur les bords des chemins Sous St-Rémi. Altitude : 1620 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août.
3. *T. aureum*. Poll. non Thuil. *T. agrarium* Schreb. Pâturages. Au bord de la route, en haut du château du bourg-de-St-Pierre. Altitude : 1655 mètres. Fleurs jaun-brun. Juin-Septembre.

NB. On trouve dans la forêt de Bossaz, vis-à-vis du village de St-Rémi, le *Lotus villosus*. Thuil. Fleurs jaunes. Juin-Juillet.

PHACA.

1. *P. australis*. L. Rochers et pâturages très-secs. Sous les lacs de Ferret ; aux Places, sous le glacier de Fortzons. Altitude : 2600 mètres. Fleurs blanches, tachées de violet. Juillet-Août. Rare.

VICIA.

1. *V. Forsteri*. Jord. Prairies près des bois, le long des haies. Sur le village de St-Rémi. Altitude : 1660 mètres.
Diagnose : Tiges et feuilles pubescentes, folioles six à dix, obovales ou oblongues-lancéolées, cuspidées, les inférieures plus petites, arrondies ou obcordées ; fleurs purpurines, unicolores, subsessiles, souvent solitaires, de grandeur médiocre ; calices à dents lancéolées-sulquées, égalant presque le tube, qui se fend par le développement du fruit ; gousses dressées, puis étalées

ou penchées, finement pubescentes, noires et glabres à la maturité, comprimées, subcylindracées; graines petites, subglobuleuses, marbrées de brun et de noir sur un fond verdâtre. Juin-Juillet.

2. *V. hirsuta*. Koch. *Errum hirsutum* L. Prairies et cultures. Près de St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs blanches striées de violet. Juin-Août. Non commune.

LATHYRUS.

1. *L. heterophyllus*. L. Endroits secs et incultes. Près de St-Rémi. Vers le château du Bourg-de-St-Pierre. Altitude : 1650 mètres. Fleurs roses et blanches. Juin-Juillet.
2. *L. Lusseri*. Heer. Dans les prairies et les pâturages. A Pradaz; aux Combes : au Bourg-de-St-Pierre. Fleurs jaunes. Altitude supérieure : 2000 mètres. Juillet-Août.
3. *L. macrorhizus*. Wimm. *Orobis tuberosus*. L. Endroits ombragés et incultes. Dans la forêt de Plantaluc. Altitude : 2200 mètres. Fleurs d'un pourpre violet passant au bleu verdâtre. Juin-Août.

ROSACÉES.

PRUNUS.

1. *P. Mahaleb*. L. Gaud. Champs, au-dessous de St-Rémi. Altitude : 1600 mètres. Fleurs blanches. Juin-Septembre.

GEUM.

1. *L. G. urbanum*. (Vulg. Herbe de St-Benoît.) Prairies et lieux incultes dans les champs. Sous St-Rémi. Altitude : 1600 mètres. Fleurs jaunes. Juin-juillet.

POTENTILLA.

1. *P. reptans*. L. (Vulg. La Quintefeuille.) Vers la vieille route sous St-Rémi. Fleurs jaunes. Juin-Août.

ROSA.

1. *R. Pyrenaïca*. Gouan. Rochers. Près du pont du Bourg-de-St-Pierre. Altitude : 1650 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août. Cette espèce se distingue de la *Rosa alpina*, L., par ses pédoncules et le tube calicinal hispide. Rare.

2. *R. lagenaria*. Vill. Rochers. Avec la précédente. Elle se distingue par ses fruits lagénéiformes, pendants, très allongés, rétrécis au-dessous des lobes calicinaux. Juin-Septembre.
3. *R. Salevensis*. Rapin. Dans les broussailles. Au pré de la scie, à St-Oyen. Déséglise. Fleurs d'un rose pourpre. Juin-Juillet.
4. *R. pomifera*. Herm. Var. *recondita*. Puget. Dans les endroits secs et incultes. Près du château au bourg St-Pierre; à St-Rémi. Fleurs roses. Altitude : 1650 mètres. Juin-Août.
5. *R. abietina*. Gren. Sur le bord des chemins, dans les champs et les prés. Entre St-Rémi et St-Oyen. Altitude : Environ 1500 mètres. Fleurs rosâtres. Juin-Août.
6. *R. montana*. Vill. *R. glandulosa*. Koch. Dans les endroits incultes. Près de St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs d'un blanc rosé. Juin-Juillet.
7. *R. coriifolia*. Fries. Dans les lieux secs. Près de la chapelle de Lorette, au bourg de St-Pierre; près de St-Oyen. Altitude : 1650 mètres. Fleurs d'un rose-vif, Juin-Août.
8. *R. Reuteri*. Godet. Au bord inférieur de la route, en sortant du village de St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs blanches, légèrement lavées de rose. Juin-Septembre. — Diagnose : Feuilles glauques, rougeâtres sur les nervures et les jeunes pousses, de 5 à 7 folioles ovales ou obovales, souvent obtuses, à dentelures ordinairement simples, stipules grandes, foliacées; fleurs 1-3, au sommet des rameaux, pédoncules, glabres ou rarement glanduleux, à peine plus longs que le tube du calice, sépales réfléchis après l'anthèse, pinnatifides, à lobules et appendices entiers; pétales grands, plus longs que le calice et se recouvrant par les bords; fruits gros, subglobuleux ou ovales, d'un rouge orangé, sépales redressés et caducs au commencement de la maturation qui a lieu en septembre.
9. *R. Boverneriana*. Pug. Ça et là sur le bord des champs et dans les taillis. A St-Oyen Déséglise. Fleurs roses. Juillet.

ALCHEMILLA.

1. *A. fissa*. Schumm. Pâturages et lieux graveleux. Sur les chalets du sommet de Proz. Au torrent, sous le glacier du Velan. Altitude supérieure : 2200 mètres. Fleur vert-jaunâtre. Juillet-Août. Assez rare. On distingue cette espèce de la *vulgaris*. par la glabréité presque complète de toutes ses parties, par les lobes et les dentelures plus profondes de ses feuilles et par ses fleurs plus grandes.

17. POMACÉES.

PYRUS.

1. *P. aria*. DC. *Crataegus aria*. L. Pâturages. Au fond des Combes, non loin du *Thalictrum minus* v. *saxatile*, Gaud. Altitude : 1950 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août.
2. *P. sudeticus*. Tausch. Pâturages secs. Au fond des Combes, dans un vallon, non loin du précédent. Altitude : 1950 mètres. Fleurs d'un rose blanchâtre, pourprées extérieurement. Juillet-Août.
3. *P. Malus*. L. *Malus acerba*. Mérat. Prairies et coteaux. Sous le village de St-Rémi. Altitude : 1620 mètres. Fleurs blanches, plus ou moins purpurines extérieurement. Mai-Septembre.

18. ONOGRARIÉES.

EPILOBIUM.

1. *E. montanum*. L. Pâturages humides. Sous la route, près de Fourtz. Altitude : 1750 mètres. Fleurs purpurines allant au violet. Juin-Août.
2. *E. collinum*. Gmel. Pâturages secs et graveleux. A la Pierraz. Altitude : 2090 mètres. Fleurs d'un pourpre violet. Juillet-Août. Cette espèce diffère de la précédente par les dimensions plus petites de toutes ses parties; par ses tiges plus courtes, très-rameuses, finement pubescentes, ainsi que les capsules, les feuilles quatre fois plus petites et plus ovales, denticulées, les inférieures opposées, les autres alternes; les fleurs plus petites.

19. PARONYCHIÉES.

HERNIARIA.

1. *H. glabra*. L. Lieux incultes et graveleux : aux bords des chemins. Aux Contours, sous St-Rémi. Altitude : 1650 mètres. Fleurs très-petites, vertes. Juin-Septembre.

SCLERANTHUS.

1. *S. annuus*. L. Aux bords des chemins. Près de St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs vertes. Juin-Août.

20. CRASSULACÉES.

SEDUM.

1. *S. villosum*. L. Endroits très-humides. Aux Contours, vers les sources. Altitude : 1900 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août.
2. *S. dasphyllum*. L. Terrains incultes ; vieux murs. Dans la forêt sur St-Rémi ; au Bourg de St-Pierre. Altitude : 1700 mètres. Fleurs blanches et tachées de pourpre. Juin-Août.
3. *S. reflexum*. L. Endroits secs et rocailleux. Entre Fourtz et le Bourg-St-Pierre. Altitude : 1700 mètres. Fleurs d'un jaune vif. Juin-Août.
4. *S. anopetalum*. DC. Lieux secs et incultes. Aux Contours ; sur St Rémi ; au fond des Combes. Altitude supérieure : 2000 mètres. Juin-août. Pétales lancéolés, linéaires, acuminés, dressés, jaune-blanchâtre.

SEMPERVIVUM.

1. *S. globiferum*. Gaud. *S. Wulfenii*. Hopp. Pâturages secs. Dans la forêt au-dessus du chalet de Menouve. Altitude : 2000 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août.
2. *S. Verloti* Jord. ex-Lagger. *S. acuminatum*. Schott, ex-Favrat. Pâturages secs et maigres. Au fond des Combes. Altitude : 2000 mètres. Fleurs purpurines et roses. Juillet-Août. Grande de 1 pied, 1½ pied.
3. *S. penninum*. Lagger. Inédit, mais je crois que ce n'est qu'une variété du *montanum*. Je l'ai récolté dans un endroit graveleux, au bord du torrent de Pradaz. Altitude : 1750 mètres. Fleurs purpurines. Juillet.

21. UMBELLIFÈRES.

BUNIAM.

1. *B. Bulbocastanum*. L. (Vulg. Coquette). Lieux cultivés. Vers le château du bourg de St-Pierre. Altitude: 1650 mètres. Fleurs blanches. Juin-Juillet.

PIMPINELLA.

1. *P. saxifraga* v. *poterifolia*. Koch. (Vulg. Persil de Bouc). Lieux secs et incultes. Sur St-Rémi. Altitude: 1700 mètres. Fleurs blanches. Juin-Août.
2. *P. saxifraga* v. *rosea*. Auct. J'ai récolté cette variété en société avec la précédente sur le village de St-Rémi; elle en diffère par ses fleurs qui sont d'un rose foncé.

BUPLEURUM.

1. *B. falcatum* L. Dans les lieux pierreux, parfois parmi les arbrisseaux. Sous St-Rémi. Altitude: 1600 mètres. Fleurs vert-jaunâtres. Juin-Août.

ÆTHUSA.

1. *Æ. Cynapium*. L. Cultures et bords des chemins. Près de St-Rémi. Altitude: 1650 mètres. Fleurs blanches. Juin-Août. (Vulg. Petite Ciguë).

CHEROPHYLLUM.

1. *Ch. Villarsii*. Koch. Lieux rocailleux. Sur le pré de Drônaz, à la Pierraz. Altitude: 2100 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août.

22. CAPRIFOLIACÉES.

LONICERA.

1. *L. nigra*. L. Rochers et endroits arides. Entre Fourtz et le Bourg de St-Pierre. Altitude: 1700 mètres. Fleurs blanches, purpurines extérieurement. Juin-Août.
2. *L. alpigena* L. (Vulg. Petit bois des paysans). Rochers et pâturages. A Tzarairé; vers la montagne de Sur-le-Four. Altitude supérieure: 2000 mètres. Fleurs rougeâtres. Juin-Août.

23. RUBIACÉES.

GALIUM.

1. *G. verum*. L. Pâturages secs. Près de Fourtz. Altitude : 1750 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août.
2. *G. eminens*. Godr. et Gren. *G. verum* b) *ochroleucum*, Gaud. Avec le précédent, mais extrêmement rare. Il diffère du *G. verum*, avec lequel il a plus de ressemblance qu'avec aucune autre espèce, par sa tige à angles plus marqués, ses feuilles moins étroites, sa panicule généralement plus allongée, à ramilles fructifères étalées, enfin par ses fleurs plus grandes, jaune-pâle, à lobes plus longuement apiculés. Juin-Août.
3. *G. Mollugo*. L. Pâturages ombragés et parfois humides. Près de Fourtz. Aux Plançades. Altitude supérieure : 2000 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août.
4. *G. sylvestre*. Poll. Pâturages. Aux Plançades. Sur-le-Four, à Fourtz. Altitude supérieure : 2000 mètres. Fleurs blanches. Juin-Août.
5. *G. rubrum* L. Pâturages. Au bord de l'aqueduc, entre le chalet de Menouve et celui de Barasson. Altitude : 2000 mètres. Fleurs rougeâtres, carnées. Juin-Août. Non loin de là, sur Eternon, on trouve le *Scleranthus perennis*. L.
6. *G. Vaillantii*. DC. Moissons et cultures. Sous St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs blanc-verdâtres. Juin-Août.

24. VALÉRIANÉES.

VALERIANA.

1. *V. procurrens*. Wallr. in L. Pâturages gras. Sous la cabane de l'Ardifagoz. A Ferret. Altitude : 2100 mètres. Fleurs d'un rose carné. Juillet-Août.

25. DIPSACÉES.

KNAUTIA.

1. *K. arvensis*. DC. *Scabiosa arvensis* L. Endroits secs et graveleux. Sous St-Rémi. Altitude : 1600 mètres. Fleurs purpurines, roses et souvent blanches. Juin-Août.

2. *K. sylvatica*. Dub. *Scabiosa sylvatica*. L. Lieux humides et ombragés, ordinairement parmi les aunes. Au fond des Plançades. Sur la cantine de Proz. Altitude : 1850 mètres. Fleurs violettes, parfois bleues. Juin-Août.

26 SYNANTHÉRÉES.

BELLIS.

1. *B. perennis*. L. Dans les pâturages un peu humides, près des sources au plateau de Pradaz. Fleurs blanches avec une couronne purpurine. Juin-Août. Rare.

ERIGERON.

1. *E. acris*. L. Lieux secs et incultes. Près de la chapelle de Lorette. Près de St-Rémi. Altitude : 1650 mètres. Fleurs roses et blanches. Juin-Août.
2. *E. Dræbachensis*. Mill. Lieux secs et arides. Aux Contours sous St-Rémi. Altitude : 1560 mètres. Fleurs presque blanches. Juin-Juillet. Diffère du précédent par la tige plus grêle, rougeâtre, glabre ; les feuilles plus longues et plus étroites, glabres, ciliées sur les bords, décroissant de grandeur jusque vers la grappe, qui est flexueuse, à rameaux plus minces.

SENECIO.

1. *S. vulgaris*. L. Aux bords des chemins Près de St-Rémi. Entre Fourtz et le bourg de St-Pierre. Altitude supérieure : 1730 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août.

TANACETUM.

1. *T. vulgare*. L. (Vulg. Herbe aux vers.) Prairies et lieux cultivés. Au Bourg de St-Pierre. A St-Rémi. Altitude : 1640 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août.
2. *T. Balsamita*. L. (Vulg. Herbe coq des jardins.) Jardins. Bourg de St-Pierre. St-Rémi. Altitude : 1640 mètres. Fleurs jaunes. Ses feuilles ont une odeur extrêmement forte et assez agréable.

ACHILLEA.

1. *A. hybrida*. Gaud. *A. moschata-nana*. Auct. Endroits rocaillieux. Au coin du lac. Altitude : 2480 mètres. Fleurs blanches. Fin Août. Rare.

MATRICARIA.

1. *M. Chamomilla*. L. Autour des habitations; jardins. Au bourg de St-Pierre; à St-Rémi. Altitude: 1650 mètres. Fleurs blanches. Juin-Août.

FILAGO.

1. *F. arvensis*. L. (Vulg. Herbe à coton). Lieux assez secs. Au bord supérieur de la route et dans la forêt sur St Rémi. Altitude: 1750 mètres. Fleurs d'un blanc jaunâtre. Juin-Août.

CIRSIUM.

1. *C. lanceolatum*. Scop. *Carduus lanceolatus*. L. Bords des chemins. Près de la chapelle de Lorette. Sur St-Rémi. Altitude: 1650 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août.
2. *C. eriophorum*. Scop. *Carduus eriophorus*. L. Lieux incultes, sous St-Rémi, à la vieille route. Entre le chalet de Menouve et celui de Barasson, au bord inférieur de l'aqueduc, sur Eternon. Altitude supérieure: 2000 mètres. Fleurs purpurines. Juillet-Septembre.
3. *C. palustre*. Scop. *Carduus palustris*. L. Lieux spongieux. Plaine, en bas de Proz. Sous les contours en haut de St-Rémi. Altitude: 1850 mètres. Fleurs purpurines. Juillet-Août.
4. *C. heterophyllum*. All. *Carduus heterophyllus*. L. Prairies et bords des ruisseaux. Sur St-Rémi. Fleurs purpurines. Juillet-Août.
5. *C. acaule*. All. *Carduus acaulis*. L. Bords des chemins et pâturages. Près de la Cantine de Proz. Altitude: 1800 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août.
6. *C. arvensis*. Scop. *Serratula arvensis*. L. Endroits incultes. Sur St-Rémi. Près de Fourtz. Altitude: 1750 mètres. Fleurs purpurines. Juillet-Septembre.

CARDUUS.

1. *C. deflorato-personata*. Gren. Dans les prairies. Près du pont St-Charles, au Bourg de St-Pierre, Déséglise. Fleurs purpurines. Juillet-Août.

LAPPA.

1. *L. minor*. DC. *Arctium minus*. Schk. Lieux incultes et aux bords des chemins. Près de St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs purpurines. Juillet-Août.

CARLINA.

1. *C. acaulis*. L. *C. caulescens*. Lam. Pâturages secs. Autour du lac; aux Combes. Sous Mont-Cubit. Altitude supérieure : 2480 mètres. Fleurs blanchâtres. Juillet-Septembre.

RHAPONTICUM.

1. *R. Scariosum*. Lam. *Centaurea Rhapontica*. L. Pâturages secs. Entre Pradaz et l'Ardifagoz, dans une espèce de petit torrent. Seule localité connue sur le St-Bernard. Altitude : 1900 mètres environ. Fleurs purpurines, grandes. Juillet-Août. C'est la plante que M. Tissière, par erreur, a prise pour l'*Inula helenium*, L. qui ne se trouve point à Pradaz. Il paraîtrait, d'après M. Murith, qu'elle se trouvait à St-Rémi, de son temps. Malgré mes courses assez fréquentes vers ce village et dans ses environs, je ne l'y ai jamais rencontrée. Peut-être a-t-elle été détruite par quelque malheureux botaniste avide de trop?

CENTAUREA.

1. *C. phrygia* b) *helvetica*. Gaud. Pâturages gras. Au pré de la Pierraz. Altitude : 2100 mètres. Fleurs purpurines. Juillet-Août. Caule simplicissimo, unifloro, foliis dentatis, dentibus mucronatis. Gaud.
2. *C. phrygia* b) *helvetica* ba) *flore albo*. Gaud. Avec la précédente au pré de la Pierraz. Fleurs blanches. Depuis, pour distinguer plus facilement cette plante, je l'appellerai : *Centaurea nivea*. Auct.
3. *C. phrygia* g) *ambigua*. Gaud. Pelouses fertiles, sur les rochers. Vis-à-vis de l'Hôpital et plus haut. Altitude : 2200 mètres. Fleurs purpurines. Elatior ramosa; foliis hirtis pubescentibus, caulinis, amplexicaulibus, basi 5-nerviis semi-pinnatifidis dentatisque; dentibus elongatis, acutis, mucronatis. Gaud. Cette forme est extrêmement rare.

4. *C. phrygia d) humilior*. Gaud. *C. ambigua*. Thom. Pâturages ombragés. Dans la forêt de Plantaluc. Altitude : 2100 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août. Uniflora, foliis, subpellucidis : caulinis amplexicaulibus, sinuato-dentatis, basi 5-nerviis. Gaud.
5. *C. Cyanus*. L. (Vulg. Bleuet). Parmi les moissons. Au château du bourg de St-Pierre. A St-Rémi. Altitude : 1650 mètres. Fleurs bleues. Juin-Août.
- C. alpestris*. Hegeschw. *C. scabiosa d) alpina*. Gaud. Pâturages fertiles. A la montagne de M. V. Marçoz à Menouve, sous la cabane. Altitude : 1900 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Juillet. Cette espèce diffère de la *C. scabiosa*, L., par sa tige bien plus courte, haute d'environ un pied à peine, uniflore, ou rarement munie d'un rameau ou deux, accessoires; capitules à involucre plus noir, plus complètement recouvert par les appendices frangés des écailles involucreales; feuilles pinnatifides, ou plus rarement entières, à lobes ascendants, rapprochés ou presque contigus, oblongs ou lancéolés, entiers ou peu lobés-dentés.

LAPSANA.

1. *L. communis*. L. (Vulg. Herbe aux mamelles). Lieux cultivés et bords des chemins. A Fourtz; près de St-Rémi. Altitude : 1690 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Juillet.

PICRIS.

1. *P. hieracioides*. L. Lieux incultes. Par la vieille route, sous Saint-Rémi. Altitude : 1600 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Juillet.
2. *P. crepoides*. Saut. Avec la précédente, mais beaucoup plus rare, avec laquelle elle diffère par ses poils la plupart simples, moins rudes; par les feuilles plus larges, les culinaires embrassantes, auriculées; par les capitules d'un tiers plus gros, et enfin, par les folioles extérieures de l'involucre peu étalées. Fleurs jaunes.
3. *P. Villarsii* Jord. Dans les prairies. Entre St-Rémi et Ceresay, aux bords du sentier. Altitude : 1550 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Juillet. Cette espèce se distingue

des deux précédentes par son indument beaucoup plus rude, plus fin et plus serré; ses feuilles plus étroites, entières ou légèrement dentées, presque planes; ses capitules moins nombreux, en corymbe lâche ou en ombelle; les involucres fructifères, légèrement rétrécis vers le milieu et devenant noirâtres à la fin; ses ligules sont concolores d'un jaune plus vif et brunâtres seulement au sommet.

TRAGOPOGON.

1. *T. pratensis*. L. Prairies et pâturages secs. Près de St-Rémi. Altitude: 1700 mètres, Fleurs jaunes. Juin-Août.
2. *T. crocifolius*. L. Lieux incultes et bords des chemins. En bas des Contours, sous St-Rémi; assez commun. Altitude: 1550 mètres. Fleurs d'un pourpre noir allant au jaune. Juillet-Août. M. l'herboriste Tavernier dit l'avoir vu à la maison d'avalanche sur Proz; je ne l'y ai jamais remarqué, je ne crois pas qu'il s'y trouve, vu que ce n'est pas son terrain.

NB. Dans le même endroit on trouve aussi le *Podospermum laciniatum*, DC. Fleurs jaunes. Juin-Juillet.

CHONDRILLA.

1. *C. rigens*. Rchb. Lieux incultes et graveleux. Aux Contours, sous St-Rémi. Altitude: 1550 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août.

SONCHUS.

1. *S. asper*. Vill. Lieux cultivés et jardins potagers. Au bourg de St-Pierre. A St-Rémi. Altitude 1650 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Juillet.

CREPIS.

1. *C. taraxacifolia* Thuil. *Barkhausia taraxacifolia*, DC. Lieux incultes et graveleux. Sous St-Rémi. Altitude: 1550 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Juillet.
2. *C. biennis*. L. (Vulg. Chicorée jaune). Lieux secs et graveleux. Avec la précédente. Fleurs jaunes. Juin-Juillet.
3. *C. blattarioïtes*. L. Pâturages secs, sur les rochers. Près de la cascade de Pradaz. Aux Combes. Altitude: 2000 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août.

HIERACIUM.

1. *H. velutinum*. Hegtsch. *H. pilosella* y) *incanum*. Gaud. Pâturages secs et graveleux, éboulis. A la Pierraz; au plan du Jouat. Altitude: 2090 mètres. Fleurs jaune-pâle. Juillet-Août.
2. *H. auriculæforme*. Fries. Endroits sablonneux. Près de la chapelle de Lorette. Altitude: 2650 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. J'ai trouvé, au fond des Combes, dans un terrain analogue au précédent, des exemplaires qui se rapprochent fort du type; je ne saurais dans quelle espèce les classer, si ce n'est à l'*auriculæforme* de Fries. Voici la diagnose de Fries: Rhizoma repens, stoloniferum, scapus racemosus (stolonus furcatus) oligocephalus, flocciis setisque glanduliferis adpersus. folia linearia vel lanceolata, acuta, glauca, superne setosa, subtus depilata, floccis tenuibus canescentia. Involucra cylindrica, cano-floccosa et glanduloso-pilosa, deflorata anguste conica, squamis exterioribus obtusis. Ligulae subtus rubro vitatae (stolonum evittatae). Species pumila, intense glauca. Scapus typice racemosus, interdum furcato-dicephalus cum pedunculo radicali. D'après cette diagnose, j'ai reçu de M. Favrat des exemplaires typiques cueillis par lui à la chapelle de Lorette; j'y en ai récolté moi-même en Août 1873. Celui du fond des Combes me paraît s'y rapporter aussi. Je l'ai récolté en quantité à la Fory, entre Sembrancher et Bovernier, au bord de la Dranse; je l'ai même remarqué plus bas, vers les vignes de Bovernier, non loin du pont en fer. C'est toujours le type.
3. *H. breviscapum*. DC. Koch. *H. pumilum* Lapey Pelouses sèches et arides. Au plateau, près de la méridienne de Jupiter. Altitude: 2470 mètres. Fleurs jaune-citron. Juillet-Août.
4. *H. Florentinum*. Wild. *H. præaltum*. Vill. Lieux rocaillieux et graveleux. Au bord du torrent qui descend de l'Ardifagoz à Pradaz, près de cette dernière localité. Altitude: 1800 mètres. Fleurs jaune-pâle. Juillet-Août.
5. *H. alpinum* b) *tubulosum*. Gaud. Pâturages. Sur les chalets du sommet de Proz; à Marengo. Altitude: 1900 à 2000 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août.

6. *H. amplexicaule*. L. Dans les fissures des rochers. Aux Combes. A la montagne de Sur-le-Four. Altitude: 2000 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août.
7. *H. Pseudo-Cerinthe*. Koch. *H. amplexicaule* e) *Pseudo-Cerinthe*. Gaud. Eboulis de rochers. A Tzaraire, au bord de la grande route, en bas de Fourtz. Altitude: 1700 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août.
8. *H. Murithianum*. Auct. ex parte. Pâturages rocailloux. Au fond des Plançades, un peu plus bas que la cantine de Proz, vers la première source; au sommet du Poyet à Mont-Cubit; à Tzermettaz, sous le plateau. Altitude supérieure: 2300 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. Espèce nouvelle et inédite. Ce *Hieracium* se rapproche plus du *H. glanduliferum*, Hopp., que de tout autre; cependant il en diffère beaucoup; d'abord par son capitule presque de moitié plus petit, parfois au nombre de 2 ou 3; ensuite par son involucre et ses pédoncules bien moins poilus, ces derniers très peu glanduleux; ses feuilles sont tout-à-fait glauques et glabres, parsemées seulement de quelques poils longs et rares et parfois nuls, très étroitement atténués en un pétiole bien distinct du limbe. Sa tige mesure jusqu'à un pied de long. J'ai récolté cette espèce pour la première fois le 25 Juillet 1870. C'est une très-jolie et très-rare espèce, tout-à-fait distincte de *H. glanduliferum*, Hop., surtout si on peut l'examiner sur place, à son état naturel.
9. *H. dentatum*. Hopp. v. *Salævense*. Fries. Pâturages secs et sur les rochers. Aux Combes. Altitude: 1900 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. Elle diffère du type par ses involucres noirâtres, moins velus, à écailles moins longuement acuminées.
10. *H. elongatum*. Wild. *H. villosum* g) *elongatum*. Gaud. Pelouses sur les rochers. Aux Combes. Altitude: 1900 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. Capitules plus petits que dans le *villosum*. L.
11. *H. sylvaticum*. Lam. Lieux rocailloux et graveleux. Au torrent de Pradaz, non loin des cabanes. Altitude: 1800 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août,

12. *H. pallidum* Fries. Lieux incultes et pâturages. Au fond des Plançades, parmi les aunes, presque vis-à-vis de la cantine de Proz ; à Tzaraire. Altitude supérieure : 1800 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août.
13. *H. cinerascens*. Fries. Eboulis graveleux. A Tzaraire, au bord de la grand'route. Altitude : 1750 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août.
14. *H. murorum* v. *subcæsius*. Fries. Tout près du précédent. Fleurs jaunes. Juillet-Août.
15. *H. picroïdes*. Vill. Pâturages rocaillieux. Vers les vieilles mesures, entre Pradaz et le fond des Combes. Altitude : 1800 mètres. Fleurs jaune-pâles. Juillet-Août. Non loin de là, *Orchis suaveolens*. Vill.
16. *H. cydoniæfolium*. Vill. Pelouses sur les rochers. Vers le pont au-dessus du Bourg de St-Pierre. Altitude : 1650 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. M. Déséglise croit que c'est le *H. bohemicum*. Fries. Je pense que, bien que les deux plantes aient quelques rapports, celle-ci est le *H. cydoniæfolium*. Vill.
17. *H. strictum*. Fries. Endroits buissonneux et sur les rochers. Château du bourg de St-Pierre : à l'endroit de l'entrepôt du bois du St-Bernard. Altitude : 1680 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août. Quelques auteurs ne font qu'une seule espèce du *H. cydoniæfolium*. Vill., et du *H. strictum*. Fries ; mais ce sont deux espèces tout à fait distinctes, avec des caractères propres à chaque espèce qui ne permettent pas de les confondre.
18. *H. prenanthoïdes*. Vill. Pelouses fertiles et sur les rochers. Aux Combes ; entre Proz et le bourg de St-Pierre. Altitude supérieure : 1900 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août.

27. CAMPANULACÉES.

PHYTEUMA.

1. *P. scorzonæfolium*. Vill. Dans les pâturages fertiles. Aux Combes, près de la cascade de Pradaz. Altitude : 1950 mètres. Fleurs bleues. Juillet-Août.

CAMPANULA.

1. *C. Scheuchzeri* v. *flore albo*. Mihi. Lieux rocaillieux et graveleux. Au torrent, sous le glacier du Velan. Altitude: 2000 à 2100 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août. Depuis, je désignerai cette jolie variété par le nom de *C. nivea* Mihi. Elle diffère du type par ses fleurs blanches, et en ce qu'elle est beaucoup plus petite dans toutes ses parties; ses feuilles sont beaucoup plus étroites et fortement acuminées. Cette forme n'a été indiquée par aucun auteur jusqu'ici, du moins que je connaisse.
2. *C. rhomboïdalis* b. *albiflora*. Gaud. Pâturages. Au fond des Combes; sous l'Ardifagoz, près du torrent. Altitude supérieure: 1980 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août.
3. *C. urticæfolia*. Schmidt. Lieux secs. Dans la forêt de Bossaz, vis-à-vis du village de St-Rémi. Altitude: 1660 mètres. Fleurs roses. Juin-Août. Elle se trouve aussi sous le village de St-Rémi.
4. *C. cenisia*. L. Eboulis et graviers des glaciers. Au torrent du Velan. Sous le glacier des Fortzons, Altitude supérieure: 2600 à 2700 mètres. Fleurs bleues. Juillet-Août.
5. *C. barbata* b. *albiflora*. Gaud. Ça et là, dans les pâturages. Aux Plançades; aux Combes. Altitude: 2000 mètres. Juillet-Août.

28. ERICINÉES.

ERICA.

1. *E. vulgaris* b. *albiflora*. Gaud. Tourbières et pâturages parmi les arbustes. Aux Plançades; à Marengo. Altitude: 2000 mètres. Août-Septembre.

RHODOPENDRON.

1. *R. ferrugineum* b. *albiflorum*. Gaud. Terrains maigres et buissonneux. Sur les rochers, sous le plateau de Plan-taluc. Altitude: 2000 mètres. Juin-Juillet. Camille Carron.
-

29. PYROLACÉES.

PYROLA.

1. *P. uniflora*, L. Dans les forêts parmi la mousse. Forêt de Bossaz, vis-à-vis du village de St-Rémi, sous l'aqueduc. Altitude : 1750 mètres. Fleurs blanches. Juin-Août.

30. PRIMULACÉES.

LYSIMACHIA.

1. *L. Nummularia*. L. (Vulg. Herbe aux Ecus.) Lieux humides et tourbeux. A Ferret. Altitude : 1700 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août.

PRIMULA.

2. *P. farinosa* L. v. *lactea*. Mihi. Nouvelle variété à fleurs tout-à-fait blanches. Terrains humides et marécageux. Au fond du Plateau de Pradaz, près d'une grosse pierre. Altitude : 1800 mètres. Juin-Août.

31. ASCLÉPIADÉES.

CYNANCHUM.

1. *C. Vincetoxicum*. R. Brow. Lieux incultes et rocailleux. Près du Bourg-St-Pierre. Altitude : 1600 mètres. Fleurs blanchâtres. Juin-Août.

32. GENTIANÉES

GENTIANA.

1. *G. purpurea* b. *lutea*. Gaud. Pâturages, parmi les arbustes. Sur les chalets de la Leivraz. Altitude : 1950 mètres. Fleurs jaunâtres. Juillet-Août.
2. *G. Clusii*. Per. et Song. Pelouses sèches, sur les rochers. Sous le glaciers de Fortzons. Altitude : 2500 mètres. Fleurs bleu-violet. Juin-Août. Les feuilles sont lancéolées, pointues, un peu carénées, les lobes du calice sont appliqués sur le tube de la corolle et forment entre eux des sinus très-aigus.
3. *G. ciliata* L. Lieux humides et argileux. A Ceresay, sous St-Rémi ; à Ferret. Altitude supérieure : 1800 mètres. Fleurs bleu-violet. Juin-Août.

33. BORRAGINÉES.

CYNOGLOSSUM.

1. *C. officinale*. L. Bords des chemins. Près de St-Rémi. Altitude : 1650 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août.

BORRAGO.

1. *B. officinalis*. L. Autour des habitations et dans les jardins. Au Bourg-St-Pierre ; à St-Rémi. Altitude : 1650 mètres. Fleurs bleues striées de violet. Juin-Août.

LYCOPSIS.

1. *L. arvensis*. L. Lieux incultes. Sous St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs violettes. Juin-Août.

LYTHOSPERMUM.

1. *L. arvense*. L. Dans les moissons. Sous St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs blanches. Juin-Août.

MYOSOTIS.

1. *M. palustris*. With. Lieux humides et marécageux. Aux Contours, aux bords des sources. Altitude : 1860 mètres. Fleurs d'un bleu pâle. Juin-Août.

34. SOLANÉES.

HYOSCYAMUS.

1. *H. niger*. L. Lieux incultes, autour des habitations. A St-Rémi. Au Bourg-St-Pierre. Altitude : 1650 mètres. Fleurs jaunâtres striées de brun. Juin-Août.

35. ANTIRRHINÉES.

VERONICA.

1. *V. urticæfolia*. Jacq. Dans la forêt de Bossaz, vis-à-vis du village de St-Rémi. Altitude : 1750 mètres. Fleurs d'un rose-violet. Juin-Août.
2. *V. spicata*. L. Lieux secs et incultes. Vers la chapelle de Lorette. Altitude : 1650 mètres. Fleurs bleues. Juin-Août.
2. bis. *V. borealis*. Fries. Dans les endroits graveleux et humides. Non loin de l'hospice du St-Bernard. Déséglise. Fleurs bleuâtres. Juillet-Août.
3. *V. serpyllifolia*. L. *v. floribus albis*. Mihi. Lieux humides. Entre la cantine d'Aoste et Plantaluc, par la route abandonnée. Altitude ; 1950 mètres. Juillet-Août. Cette forme est très-petite.
4. *V. verna*. L. Aux bords des chemins et dans les cultures. Au-dessus du village de St-Rémi. Altitude : 1700 mètres. Fleurs bleuâtres. Mai-Juillet.

5. *V. triphyllos*. L. Dans les champs et aux bords des chemins. Sous St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs d'un bleu violet. Mai-Juillet.
6. *V. opaca*. Fries. Bords des chemins et des cultures. Sous St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs d'un bleu violet, plus rarement striées de blanc. Mai-Juin. Diagnose : Sépales patulés; corolle bleue; étamines insérées à la gorge de la corolle et non à la base du tube; capsule bien plus large que longue et presque réniforme, couverte de poils crispés et non glanduleux; à lobes renflés et non carénés sur les bords, enfin graines arrondies et non oblongues au nombre de 2-4 seulement dans chaque loge.
7. *V. hederifolia*. L. Cultures et bords des chemins. Sous St-Rémi. Altitude : 1600 mètres. Fleurs bleuâtres. Mai-Juin.
8. *V. præcox*. All. Cultures. Sous St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs violettes. Mai-Juillet. Commune.

36. OROBANCHÉES.

OROBANCHE.

1. *O. epithymum*. DC. Pâturages secs. Sous les rochers entre les Combes et l'Ardifagoz. Altitude : 2000 mètres. Fleurs carnées, légèrement purpurines. Juillet-Août.

37. RHINANTACÉES.

EUPHRASIA.

1. *E. alpina*. Lam. Pâturages et prairies. A la Pierraz; à Pradaz. Altitude : 2000 mètres. Fleurs grandes, blanches, lavées de violet et parfois de jaune, comme les espèces suivantes. Juin-Août.
2. *E. nitidula*. Reuter. Pâturages. Vers le pré de la cure, au-dessus de St-Rémi. Altitude : 1680 mètres. Fleurs blanches et violettes mêlées de jaune. Juillet-Août. Diagnose : Tige rameuse, d'un rouge brun, finement couverte d'un duvet appliqué, non glanduleux; rameaux dressés, étalés, subflexueux; feuilles ovales un peu épaisses, d'un vert sombre, un peu luisantes en-dessous et presque glabres, les inférieures à dents obtuses,

celles des supérieures et des florales aiguës, parsemées ainsi que les calices de poils glanduleux; corolles petites, à tube inclus dans le calice; capsules assez grandes, ovales, oblongues, rétuses et légèrement émarginées au sommet, ciliées sur les bords et de la longueur du calice.

3. *E. hirtella*. Jord. Pâturages rocaillieux. Au plateau de Pradaz; à Fourtz. Altitude: 1780 mètres. Juillet-Août. Diagnose: Plante toute couverte d'une pubescence étalée, grisâtre, mêlée de poils glanduleux à la partie supérieure, sur les feuilles florales et les calices; tiges simples ou peu rameuses, à rameaux dressés; feuilles largement ovales, les inférieures écartées, à dents obtuses, les supérieures contiguës et imbriquées, à dents aiguës acuminées; corolles petites, à tube inclus dans le calice, pubescentes extérieurement; lèvre supérieure à lobes très étroitement réfléchis en dehors, l'inférieure plus pâle et plus blanche rayée de violet; capsules plus courtes que la feuille florale, dépassant peu ou point le calice. Plante raide atteignant jusqu'à un demi-pied de long.
4. *E. cuprea*. Jord. Pâturages secs et rocaillieux. Au plateau de Pradaz, avec la précédente. Juillet. Diagnose: Tiges minces, rigides, noirâtres, rameuses, à rameaux ascendants, flexueux, munies d'un indument blanchâtre et comme pulvérulent, formé de petits poils rebroussés et appliqués; feuilles lancéolées ou oblongues, rétrécies à la base, souvent d'un vert brun ou cuivré, glabres, luisantes, munies de chaque côté de 4 à 6 dents étalées, aiguës, celles des supérieures et des florales longuement aristées; fleurs petites, en grappes lâches, flexueuses; corolles rosées ou lilas striées de violet, à tube inclus dans le calice; capsule oblongue, linéaire, presque glabre, tronquée au sommet, plus courte que les lobes calicinaux et que la feuille florale.
5. *E. salisburgensis*. Hopp. Parmi les rocailles et les pâturages pierreux. Mont-Cubit; Plançades; cantine de Proz; Combes. Altitude supérieure: 2400 mètres. Cette plante est très voisine de la précédente, dont elle se dis-

tingue par un port plus trappu, des feuilles vert clair, moins luisantes, plus larges, imbriquées dans le haut de la tige et des rameaux, et cachant presque les fleurs; les dents des feuilles florales plus longues et plus divergentes. Juillet-Août.

PEDICULARIS.

1. *P. rostrata*. L. v. *floribus albis*. Mihi. Pelouses sur les rochers. A Marengo, près de l'*Aconitum hebeginum*, DC. Altitude : 1950 mètres. Août-Septembre.
2. *P. cenisia*. Gaud. Pelouses sur les rochers. Aux places, enclavées au milieu des rochers, sous le glacier des Fortzons. Altitude : 2600 mètres. Fleurs carnées et purpurines. Juillet-Août. Extrêmement rare.

38. LABIÉES.

MENTHA.

1. *M. sylvestris*. Wild. Prairies et pâturages humides. A la montagne de Pointier. Altitude : 1800 mètres. Fleurs légèrement violettes. Juin-Août.

THYMUS.

1. *Th. lanuginosus*. Schk. *Th. serpyllum* b. *grandiflorus a hirsutus*. Gaud.? Graviers. Au torrent du sommet de Proz. Altitude : 1900 mètres. Fleurs purpurines. Juillet-Août.
2. *Th. pannonicus*. All. Lieux incultes. Près de St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Juillet.
3. *Th. glabrescens*. Wild. Avec le précédent. Il s'en distingue par sa tige légèrement pubescente et par 5 feuilles linéaires.
4. *Th. Acinos*. L. Lieux incultes. Sous St-Rémi. Altitude : 1620 mètres. Fleurs violettes. Juin-Juillet.

CLINOPODIUM.

1. *C. vulgare*. L. (Vulg. Grand Basilic sauvage.) Lieux incultes et bords des chemins. Sous St-Rémi. Altitude : 1630 mètres. Fleurs purpurines. Juin-Août.

SALVIA.

1. *S. pratensis*. L. Prairies et pâturages. Sur St-Rémi; près de Fourtz. Altitude: 1700 mètres. Fleurs bleu-violet. Juin-Août.

GALEOPSIS.

1. *G. præcox*. Jord. Terrains graveleux. Au bord supérieur de la route, entre Proz et Fourtz. Altitude: 1800 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août. Diagnose: Tige peu élevée, simple ou peu rameuse, faiblement renflée sous les nœuds; feuilles oblongues-lancéolées, non longuement acuminées; fleurs petites; dents du calice courtes et peu piquantes; corolle blanchâtre, rarement rosée, à lèvre supérieure droite, à peine voûtée, l'inférieure à lobes latéraux ovales, très-obtus, l'intermédiaire arrondi, obovale, obscurément crénelé, avec une tache jaune entourée de lignes roses, nucules grosses, largement ovales.

STACHYS.

1. *S. recta*. L. Pâturages et rocailles. Au fond des Combes; au plateau de Pradaz, avec le *Th. fætidum*. L. Altitude: 1800 à 1900 mètres. Fleurs jaune-pâles. Juillet-Août.

39. PLANTAGO.

1. *P. lanceolata*. L. Pâturages graveleux. Aux bords du torrent qui descend de l'Ardifagoz à Pradaz. Altitude: 1900 mètres. Fleurs rosâtres. Juin-Août.

40. AMARANTHACÉES.

AMARANTHUS.

1. *A. caudatus*. L. Dans les décombres autour des habitations Bourg-de-St-Pierre. St-Rémi. Altitude: 1645 mètres. Fleurs purpurines et verdâtres. Juin-Août.

41. CHENOPODIÉES.

CHENOPODIUM.

1. *C. album*. L. Aux bords des chemins. Près de Fourtz. Altitude: 1750 mètres. Fleurs verdâtres. Juillet-Août.

ATRIPLEX.

1. *A. patula*. L. Aux bords de la grande route, près de Fourtz. Altitude : 1750 mètres. Fleurs vertes. Juillet-Août.

42. POLIGONÉES.

RUMEX.

1. *R. acetosella*. var. *multifidus*. Koch. *R. multifidus*. St. Lieux secs et pâturages. Près du chalet de Barasson. Entre Proz et Fourtz ou Soutz. Altitude supérieure : 2000 mètres. Fleurs jaunâtres. Juin-Juillet.

43. EUPHORBIACÉES.

EUPHORBIA.

1. *E. dulcis*. L. Dans la forêt au-delà du plateau de Plan-taluc. Altitude : 2050 mètres. Fleurs jaunâtres. Juin-Août.

44. SALICINÉES.

SALIX.

1. *S. grandifolia*. Ser. Escarpement de rochers. Sur la route, au lieu dit : Tzaraire. Altitude : 1700 mètres. Juin-Août.
2. *S. fœtida*. Schl. Pâturages et prairies. Prés, au-delà de la Dranse, vis-à-vis de la cantine de Proz. Altitude ; 1800 mètres. Juin-Août.

POPULUS.

1. *P. tremula*. L. (Vulg. Tremble.) Aux Lancettes ; à Tzaraire ; au fond des Plançades ; à Pradaz, sous les rochers. Altitude supérieure ; 2000 mètres. Juin-Août.

46. LILIACÉES.

ALLIUM.

1. *A. carinatum*. L. Endroits secs. Près du château du Bourg-de-St-Pierre. Altitude : 1650 mètres. Juillet-Août. Fleurs d'un rose foncé ou purpurines.
2. *A. sphærocephalum*. L. Lieux secs et rocailleux. Au château du Bourg-de-St-Pierre. Altitude : 1650 mètres. Fleurs purpurines. Juillet-Août.

46. SMILACÉES.

MAIANthemum.

1. *M. bifolium*. DC. Endroits buissonneux. Sur la Laivraz. Dans la forêt de Plantaluc. Altitude supérieure : 2000 mètres. Fleurs jaunes. Juin-Août.

47. ORCHIDÉES.

ORCHIS.

1. *O. sambucina*. L. Pâturages et prairies. Au fond des Combes; sous la cabane de l'Ardifagoz; à Proz. Altitude supérieure : 2000 mètres. Fleurs jaunes. Juillet-Août.

48. JONCACEES.

JUNCUS.

1. *J. lamprocarpus*. Ehrh. Endroits humides et buissonneux. Parmi les aunes, sous St-Rémi. Altitude : 1620 mètres. Fleurs noirâtres. Juin-Août.

LUZULA.

1. *L. albida*. DC. Pâturages. Entre Fourtz et le Bourg-de St-Pierre, près de la route. Sur St-Rémi. Altitude : 1700 mètres. Fleurs blanchâtres. Juin-Août.
3. *L. nivea*. DC. *Juncus niveus*. L. Pâturages. Aux Combes; aux Plançades; à Pradaz. Altitude supérieure : 2000 mètres. Fleurs blanches. Juillet-Août. Dans le *Guide* de M. Tissières, page 90, n° 4, lisez : *L. Lutea*. DC. Fleurs jaunâtres.

49. CYPÉRACÉES.

SCIRPUS.

1. *Sc. sylvestris*. L. Prairies humides. Vers le pont de Bos-saz, sous St-Rémi. Altitude : 1550 mètres. Fleurs verdâtres. Juin-Juillet.

CAREX.

1. *C. teretiuscula*. Schk. Good. Lieux ombragés. Sur l'acqueduc, au-dessus du chalet Marcoz à Menouve. Altitude : 1900 mètres. Juin-Août.

2. *C. caespitosa*. L. *C. pacifica*. Dreyer. Pâturages humides. Entre les Contours et St-Rémi. Altitude : 1800 mètres. Juin-Août.
3. *C. aterrima*. Hopp. Prés et pâturages. A la Pierraz : à Mont-Cubit. Altitude supérieure : 2400 mètres. Juillet-Août.
4. *C. præcox*. Jacq. *C. verna*. Vill. Pâturages des bois. Sous le chalet de Menouve ; dans la forêt de Plantaluc, tout près de l'*Eriophorum latifolium*. Gaud. *Valeriana dioica*. L. *C. ornithopoda*. Koch. Altitude : 1900 mètres. Juin-Août.
5. *C. turfosa*. Fries. Pâturages humides. Au sommet des Contours. Altitude : 1900 mètres. Juin-Août. Diagnose : Spicis gracilibus distinctis, mascula solitaria, fœmineis distigmaticis, gracilibus arrestis, bracteis foliaceis, culmum subæquantibus ; fructibus stipitatis ovatis acutis adpressis lævibus, intus planis, extus convexis, squamam superantibus, culmo acutangulo-rigido inferne polyphylo ; foliis, strictis, canaliculatis, late carinatis, vaginis parce fibrillosis, radice cespitosa, brevique stolonifera. Eximia species, præcedentibus cognata, et *C. vulgari* similior, vaginis (parce quidem, at non tenuiter ut in *C. caespitosa*) fibrilliferis, foliis angustis carinatis spicisque facile distincta. Quando in cæspites stipitata nascitur, vaginæ inferiores aphyllæ adsunt ; cum vero cæspites soluti desunt, culmi tamen (curvuli) basi aphylli et fasciculus foliorum persistentium a radice remotus.
6. *C. pallescens*. L. Pâturages subhumides et parfois tourbeux. A Marengo. Au fond des Plançades, vers les sources. Près de St-Rémi. Altitude supérieure : 2000 mètres. Juillet-Septembre.
6. *C. distans*. L. Lieux humides. Aux Contours, près des sources. Altitude : 1900 mètres. Juin-Août.
8. *C. firma*. Host. Pâturages secs et sur les rochers. Aux Plançades ; à Mont-Cubit ; en-delà du Jardin du Valais. Altitude supérieure : 2500 à 2600 mètres. Août-Septembre.
NB. A Mont-Cubit on récolte aussi le *C. digitata*. L.

50. GRAMINÉES.

PHLEUM.

1. *P. hirsutum*. Saut. Lieux rocailleux et graveleux. Le long du torrent, sous le glacier du Velan. Altitude : 2000 mètres. Juillet-Août.

KCLERIA.

1. *K. cristata*. Pers. Lieux incultes et graveleux. Sous St-Rémi. Altitude : 1600 mètres. Juillet-Août.

POA.

1. *P. nemoralis*. *II formula*. Gaud. Aux bords du torrent qui descend de l'Ardifagoz à Pradaz ; à Tzaraire. Altitude supérieure : 1850 mètres. Juillet-Août.

BROMUS.

1. *B. tectorum*. L. Lieux secs et incultes. Sous St-Rémi. Altitude : 1580 mètres. Juillet-Août.

LOLIUM.

1. *L. perenne*. L. Moissons et aux bords des chemins. Sous le château du Bourg-St-Pierre. Altitude : 1650 mètres. Juillet-Août.

51. EQUISETACÉES.

EQUISETUM.

1. *E. limosum*. L. Terrains limoneux et graveleux. Près de Ceresay. Altitude : 1530 mètres. Juin-Août.

52. FOUGÈRES.

POLYPODIUM.

1. *P. Dryopteris*. L. Pâturages arides et rocailleux. Aux Plançades. Altitude : 1900 mètres. Juillet-Septembre.
2. *P. Robertianum*. Hoffm. Avec la précédente ; mais bien plus rare. Juillet-Septembre. Cette espèce se distingue de la précédente par sa fronde plus droite et plus ferme, dont le pourtour forme un triangle plus allongé,

et surtout par les poils courts et glanduleux qui recouvrent la fronde et les divisions du pétiole; les groupes des capsules sont plus nombreux et presque contigus à la maturité.

POLYSTICHUM.

1. *P. tanacetifolium*. DC. *P. spinulosum* b. *dilatatum*. Koch. Pâturages rocaillieux et dans les bois. Aux Plançades, près de la Dranse; sur la Laivraz, parmi les aunes. Altitude: 1900 mètres. Se distingue du type par ses frondes plus largement ovales-triangulaires, par les lobes des segments presque tous distincts, les supérieurs seuls confluent, et tous fixés sur un rachis étroit. Juillet-Août.

CYSTOPTERIS.

1. *C. fragilis* b. *pinnatipartita*. Koch. Pâturages rocaillieux. Aux Plançades; sur la Laivraz parmi les aunes. Altitude: 1950 mètres. Juillet-Août.
2. *C. alpina*. Link. *C. regia* b. *alpina*. Koch. Pâturages rocaillieux et escarpés des Plançades et de Mont-Cubit: sous le plateau Tzermettaz. Altitude: 2400 mètres. Juillet-Août. Cette espèce ou variété se distingue du type par sa fronde très-finement divisée, à lobules étroits, obtus ou tronqués, à peine plus larges que le rachis, bi-, tri-denticulés au sommet.

Monsieur le Chanoine Camille CARRON m'a communiqué la découverte des plantes suivantes :

Lactuca Scariola. L. Dans les lieux secs. Au-dessous de St-Rémi. Juillet-Août. Fleurs jaunes.

Linaria minor. Desf. Dans les endroits arides. Près de la Grange, à St-Oyen. Juillet-Août. Fleurs d'un blanc rosé.

Dracocephalum Ruyschiana. L. Dans les pâturages rocaillieux. Près de la montagne du R^d Curé d'Orsières, à Ferrex. Juillet-Août. Fleurs d'un bleu-violet.

Ajuga Chamæpitys. Schreb. Dans les endroits secs. Au sommet de la vallée de Bossaz. Juillet-Août. Fleurs jaunes.

Listera ovata. R. Brwn. Dans les prairies. Vers la scie. de St-Oyen. Juillet-Août. Fleurs verdâtres.

Paris quadrifolia L. Dans les taillis et dans les bois. Non loin de la scie, à St-Oyen. Juillet-Août. Fleurs jaunâtres.

ERRATUM. — Au bas de la page 44, supprimer le paragraphe concernant *Arabis perennis*.

LISTE

de quelques plantes nouvelles pour le Valais
et de quelques autres non encore indiquées dans les localités suivantes.

Thalictrum simplex. L. Au Giétroz, dans la vallée de Bagnes. Favrat. Juillet-Août. Je l'indique parce que Rion paraît douter de l'affirmation de Murith.

Ranunculus tutulentus. Per. et S. A Schwartzzen-See, près de Zermatt. Lager. Juillet-Août.

Ranunculus Drouetii. Schultz. Dans les fossés, au bord de la route entre Viège et Tourtemagne. Juin-Juillet.

Fumaria Laggeri. Jord. Près de Zermatt. Lager. Juin-Août.

Fumaria Vaillantii. Lois. A Findelen, près de Zermatt. Lager. Juillet-Août.

Arabis muralis. Bert. Entre Brigue et Viège, vis-à-vis de Brigerbad. Juin-Juillet.

Eruca sativa. Lam. A Branson. Favrat. Juin-Juillet.

Alyssum alpestre. L. Au Riffel; au Görner-Grat, près de Zermatt. Lager. Juillet-Août.

Camelina sylvestris. Wallr. A Branson, malgré Rion. Favrat. Mai-Juin.

Camelina microcarpa. Andrz. Aux Marques. Juin-Juillet.

Camelina dentata. Pers. Près de Münster. Favrat. Juillet-Août.

Hutchinsia affinis. Godr. et Gren. Au Gries. Lager. Juillet-Août.

Viola odorata. L. Au Roc-Percé, près de Sembrancher.

Viola Riviniana. Rchb. Au pied du Mont-Chemin, à Martigny. Avril-Juin.